

Avec l'éthyloteste, on peut se tester pour éviter de créer des accidents. Il peut s'acheter dans les grandes surfaces, les pharmacies et stations services.

Pour diminuer le taux d'alcool dans le sang, il faut laisser du temps...
 L'organisme élimine en moyenne 0,15 g/l d'alcool par heure. Seul le temps peut diminuer le taux d'alcool dans le sang. 1 dose (1 verre) = 18.30 d'attente
 Pour diminuer le taux d'alcool dans le sang, il faut laisser du temps...

Les effets de l'alcool dans le sang

Perte totale d'équilibre Risque de coma Éthylrique	2 g/l = 8 verres
Beaucoup moins de réactivité Difficulté à parler et à rester droit	1 g/l = 4 verres
Une perte de la capacité visuelle de 15% Difficulté à estimer la vitesse de conduite	0,5 g/l = 2 verres

Jeune conducteur: A
 Max 0,2 g/l
 avec 3 ans d'expérience:
 Max 0,5 g/l
 C'est la loi

alcool
 AU VOLANT =
 ACCIDENT



1 verre d'alcool fort (3cl) à 40° = 1 verre de vin (12cl) à 12° = 1 verre de bière (15cl) à 5°

1 verre = 1 dose = 0,15 g/l d'alcool dans le sang:
 Quelle que soit la boisson alcoolisée, un verre représente la même quantité d'alcool, soit 10g d'alcool pur!